

ABSCESOS

Los abscesos en bovinos son infecciones causadas por bacterias piogénicas, que son aquellas que generan erupciones purulentas.

Pueden desarrollarse en animales de cualquier edad y sistema productivo, pero son más frecuentes y tienen un mayor impacto económico en el ganado estabulado.

¿Qué es un absceso? El absceso es la acumulación de pus dentro del tejido inflamado, llamado también tumor o postema. Tipos de abscesos.

1. Hay abscesos SUPERFICIALES que son los que se localizan inmediatamente debajo de la piel (tejido subcutáneo).

2. Hay otros que atacan órganos específicos (pulmones, hígado, estómago, etc.).


Los síntomas de los abscesos son, dolor, calor, dolor a la palpación, enrojecimiento, fiebre, tumefacción, congestión del tejido, hinchazón lo cual aumenta de tamaño a medida que aumenta el pus.



CAUSAS DE LOS ABSCESOS

- Golpes
- Mala aplicación de inyecciones
- Picaduras y mordeduras Cuando los animales son picados o mordidos por arañas, garrapatas, piojos, nuches, murciélagos, etc., estos inoculan sustancias tóxicas (venenosas) y producen una herida, que es puerta de entrada a infecciones, estas ocasionan abscesos.
- Heridas profundas e infectadas.

La prevención de los abscesos está directamente relacionada con las buenas prácticas.



Ahora, vamos a comenzar el tratamiento de los abscesos. Durante el tratamiento tenga en cuenta siempre las siguientes medidas de aseo:

- Use desinfectantes sobre la zona, antes de la intervención de los abscesos.
- Esterilice o desinfecte el equipo que va a utilizar, ideal usar desechable (bisturí, pinzas, tijeras, jeringas, agujas, etc.).
- Lávese las manos con un desinfectante, antes y después de la intervención del absceso, use guantes de cirugía, lo cual es lo más recomendado.

Recuerde, que si tiene heridas en las manos debe evitar el contacto directo con el contenido del absceso (pus). **USE GUANTES**

Si el absceso está recién aparecido, lo puede tratar con pomadas desinflamatorias o calientes, de uso externo con el fin de disolverlo o madurarlo en un tiempo de 8 a 10 días.

DRENAJE QUIRÚRGICO. Realizar una incisión larga o en cruz que evite que los bordes de la piel se puedan unir fácilmente.

Extraiga el pus, abra el absceso con bisturí, haciendo una cortada en la parte más blanda y baja del absceso para facilitar la salida del material descompuesto.

Coloque gasa empapada de yodo puro en la herida. Esa gasa consiste en introducir en el absceso un pedazo de gasa empapada en el desinfectante utilizado, para evitar que se siga acumulando material descompuesto en la herida. La gasa se deja por 24 horas, se cambia por otra empapada con desinfectante para evitar la multiplicación de bacterias y vuelve a retirarse a las 24 horas. Hacer este proceso hasta que logre cicatrizar internamente el absceso.

Pocas veces se requieren antibióticos. Se recomienda hacer evaluar de un veterinario para tomar la decisión de aplicarlos.

